



にこにこニュース



おおいた こども びょういん
大分こども病院
 〒870-0943 大分県大分市片島 83-7
<http://www.oita-kodomo.jp/>

2012・3月号 (No.263)
 (代表) TEL097-567-0050 (救急) TEL097-567-2311
 (順番) TEL097-554-7000 (Fax) TEL097-568-7057

ロタウイルスワクチンについて

ロタウイルス胃腸炎とは

- ・ロタウイルス胃腸炎は、乳幼児に多く起こるウイルス性の胃腸炎です。ロタウイルス胃腸炎の原因「ロタウイルス」は全世界に広く分布し、衛生状態に関係なく世界各地で感染がみられます。
- ・ロタウイルス胃腸炎の多くは突然の嘔吐に続き、白っぽい水のような下痢を起こします。発熱を伴うこともあり、回復には1週間ほどかかります。また、ほとんどの場合は時に治療を行わなくても回復しますが、時に脱水、腎不全、脳炎・脳症などを合併することもあり、症状が重く脱水が強い場合には入院が必要となることもあります。
- ・日本でのロタウイルス胃腸炎の発症は冬～春に多く、主に生後3～24カ月の乳幼児に起こりますが、ピークは生後7～15カ月です。生後3カ月までは、母親からもらった免疫によって感染しても症状が出ないか、症状があっても軽く済みますが、生後3カ月以降に初めて感染すると重症化しやすくなります。
- ・ロタウイルス胃腸炎の重症化は、ワクチン接種によって防ぐことができます。

ロタウイルス胃腸炎を予防するワクチン

- ・現在、世界ではロタウイルス感染症を予防するワクチンとしてロタリックス内用液、ロタテック内用液の2種類を使用しています。日本では、ロタリックス内用液が2011年11月に発売され、ロタテック内用液は2012年3月現在、発売準備中です。
- ・ロタリックス内用液は任意接種です。今のところ公的からの補助はありません。

ロタリックス内用液の接種方法

- ・ロタリックスワクチンは、甘いシロップ状の経口ワクチン製剤です。
- ・接種はチューブに入った1回分(1.5mL)のワクチンを直接お子様の口に入れて行います。
- ・生後6週から24週までの間に2回接種します。
- ・1回目は生後14週までに行う必要があります。
- ・2回目の接種は1回目の接種から27日(4週間)以上あけてください。

ロタリックスワクチンの副反応について

- ・国内臨床試験で接種後30日間に報告された主な副反応は、ぐずり(7.3%)、下痢(3.5%)、咳・鼻みず(3.3%)でした。その他、発熱、食欲不振、嘔吐などがみられました。
- ・海外臨床試験では、ぐずり、下痢(1～10%未満)、鼓腸(おなかがふくれること)、腹痛、皮膚炎(0.1～1%未満)でした。海外の市販後で、接種後に報告されたおもな副反応は腸重積症、血便排泄、重症複合型免疫不全(SCID)のある患者さんのワクチンウイルス排泄を伴う胃腸炎でした。

接種後の注意点

- ・健康状態の観察を行い、体調の変化に十分注意してください。高熱、けいれんなどの異常な症状がみられた場合は、速やかに医師の診察を受けるようにしてください。
- ・腸重積と思われる症状(ぐずったりする、泣きと不機嫌を繰り返す、顔色が悪い、繰り返し起きる嘔吐、イチゴジャムのような血便、お腹のはりなど)がみられた場合は、速やかに医師の診察を受けるようにしてください。なお、海外の発売後の調査では、本剤の初回接種から31日間は腸重積のリスクが増加する可能性があるとしており、ほとんどの腸重積の発症例は、初回接種から7日間に報告されています。そのため、特にこれらの期間は健康状態の観察を十分に行ってください。
- ・ワクチン接種後1週間程度は便中にウイルスが排泄されますが、排泄されたウイルスによって胃腸炎を発症する可能性は低いことが確認されています。念のために、おむつ交換後などワクチン接種を受けたお子様と接した際には手洗いをするなど注意してください。

当院にて、ロタウイルスワクチン接種
 できます。ご希望の方は、最寄りのス
 タッフまで。(電話可)

☎097-567-0050

よくある電話問い合わせQ&A


Q. 坐薬を使っても熱が下がりません。また使ってよいですか？

A. 坐薬は通常1日2回までで、最高3回までとなっています。薬なので
 間隔（6～8時間）はしっかりあけるようにして下さい。

また、解熱剤を使ったからといって、一気に平熱まで下がるわけでは
 ありません。39度あったのが38度まで下がるだけで、呼吸が楽に
 なってぐっすり眠れるようになるはずですよ。1度下がったら効いたと
 考えていいでしょう。

それ以外では、氷枕で冷やしてあげたり、夏場ならクーラーを使用し、
 室温を調節したり、着る物や掛け物で調節をするようにしてあげて下
 さい。水分がとれるようであればこまめに与えるのもよいと思います。
 もし一旦下がっていた熱が再び上がるとてもきつそう・眠れない時
 は、4時間あいていればもう1回使っても構いません。（毎日でなけれ
 ば1日4回使う日があってもかまいません。）

熱を下げること、イコール病気を治すことではなく、体を休めて病気が
 早く治るのを手助けするのが解熱剤を使う目的です。



わいがや

～離乳食講習会～

テーマ：卵・牛乳を使わない
 おやつ
 簡単にできて美味しい
 おやつを食べながら、
 食事に関する相談をお
 受けします。

平成24年3月14日（水）

時間：10時～12時

場所：元ほじん薬局
 （病院隣の建物）

定員：6名

※月齢に関係なく、気軽
 にご参加ください。

※申し込みは最寄りの
 スタッフまで（電話可）



平成24年3月の医師のお休み予定



1	木	木下、光武(午前)、佐々木(午後)、徳重(午後)	16	金	佐々木、光武
2	金	光武、須田(午前)	17	土	須田、久富、石原、木下
3	土	中西、久富、多々良(午後)	18	日	
4	日		19	月	多々良、石原(午後)、光武
5	月	須田、光武	20	火	
6	火	多々良、中西、佐々木(午後)、小林(午後)	21	水	佐々木、久富
7	水	木下、久富、須田(午後)、徳重(午後)	22	木	須田、中西(午後)、多々良(午後)、徳重(午後)
8	木	光武、石原、須田、多々良(午後)、吉田(午後)	23	金	光武、佐々木(午後)、吉田(午後)
9	金	佐々木、中西(午前)	24	土	多々良、石原(午後)、木下、須田(午後)、 小林(午後)
10	土	多々良、光武(午後)、木下(午後)	25	日	
11	日		26	月	須田、石原(午後)、中西
12	月	木下、中西(午後)	27	火	木下、石原、佐々木(午後)、吉田(午後)
13	火	光武、佐々木(午後)、徳重(午後)	28	水	光武(午前)、久富(午後)、中西(午前)、徳重(午後)
14	水	多々良(午後)、小林(午後)	29	木	中西、石原、須田、多々良(午後)
15	木	中西、須田(午後)、多々良、吉田(午後)	30	金	佐々木、久富、木下(午前)
			31	土	久富、木下、須田(午後)、小林(午後)

※院長の予定は掲載しておりません。随時お問い合わせ下さい。

※業務の都合により休みが変更になることがあります。ご了承ください。

予防接種について

4月はポリオの予防接種の実施
 月です。予防接種は予約制です。
 ポリオの予約は3/26（月）
 以降（予定）にお電話でお願いし
 ます。☎097-567-0050

皮膚科休診日

3/28（水）、3/29（木）、3/30（金）